

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G20120296

延芝堂牌蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉

- 【原料】 蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉、硬脂酸镁
- 【辅料】 无
- 【生产工艺】 本品经过筛、混合、分装等主要工艺加工制成。
- 【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】 药品包装用复合膜应符合YBB00132002的规定。
- 【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	浅棕色至棕色
滋味、气味	具本品特有的滋味、气味，无异味
状态	粉末，无肉眼可见杂色杂质

- 【鉴别】 无
- 【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
水分，%	≤6	GB 5009. 3
灰分，%	≤8	GB 5009. 4
铅（以Pb计），mg/kg	≤0. 5	GB 5009. 12
总砷(以As计)，mg/kg	≤0. 3	GB 5009. 11
总汞(以Hg计)，mg/kg	≤0. 3	GB 5009. 17
六六六，mg/kg	≤0. 1	GB/T 5009. 19
滴滴涕，mg/kg	≤0. 1	GB/T 5009. 19
其他污染物限量	符合规定	GB 2762

其他农药最大残留量	符合规定	GB 2763
-----------	------	---------

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤1000	GB 4789. 2
大肠菌群，MPN/g	≤0. 40	GB 4789. 3 “MPN计数法”
霉菌和酵母，CFU/g	≤50	GB 4789. 15
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789. 4
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789. 10

【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
腺苷，mg/100g	≥245	1 腺苷的测定

1 腺苷的测定（来源于《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版））

1.1 范围

本方法规定了保健食品中腺苷的测定方法。
 本方法适用于以冬虫夏草为主要原料的保健食品中腺苷的测定。
 本方法的检出限：0. 04μg。
 本方法的线性范围：0. 40～60. 0μg/mL。

1.2 原理：将粉碎的胶囊、片剂试样使用乙醇-水进行提取，根据高效液相色谱紫外检测器定性定量检测。

1.3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用双蒸水。

- 1.3.1 磷酸二氢钾：分析纯。
- 1.3.2 无水乙醇：优级纯。
- 1.3.3 甲醇：优级纯。
- 1.3.4 提取液：乙醇-水=3:2。
- 1.3.5 腺苷标准溶液：准确称量腺苷标准品0. 0100g，加入水溶解并定容至25mL。此溶液每mL含0. 4mg腺苷。


1.4 仪器

- 1.4.1 高效液相色谱仪：附紫外检测器（UV）。
- 1.4.2 超声波清洗器。
- 1.4.3 离心机。

1.5 分析步骤

- 1.5.1 试样处理：取20粒以上片剂或胶囊试样进行粉碎混匀，准确称取适量试样（精确至0. 001g）于25mL容量瓶中，加入约20mL提取液，超声提取10min。取出后加入提取液定容至刻度，混匀后以3000r/min离心3min。经0. 45μm滤膜过滤后供液相色谱分析用。
- 1.5.2 液相色谱参考条件
 - 1.5.2.1 色谱柱：C₁₈柱，4. 6×150mm，5μm。
 - 1.5.2.2 柱温：室温。
 - 1.5.2.3 紫外检测器：检测波长254nm。
 - 1.5.2.4 流动相：甲醇-0. 01mol/L磷酸二氢钾溶液=10:90。

- 1.5.2.5 流速：1.0mL/min。
- 1.5.2.6 进样量：10μL。
- 1.5.2.7 色谱分析：取10μL标准溶液及试样溶液注入色谱仪中，以保留时间定性，以试样峰高或峰面积与标准比较定量。



腺苷标准溶液色谱图

- 1.5.3 标准曲线制备：分别配制浓度为0.400、2.00、4.00、20.0、60.0μg/mL腺苷标准溶液，在给定的仪器条件下进行液相色谱分析，以峰高或峰面积对浓度作标准曲线。
- 1.5.4 分析结果的表示
- 1.5.4.1 计算

$$X = \frac{h_1 \times C \times V \times 100}{h_2 \times m \times 1000}$$

式中：

- X—试样中腺苷的含量，mg/100g；
- h₁—试样峰高或峰面积；
- C—标准溶液浓度，μg/mL；
- V—试样定容体积，mL；
- h₂—标准溶液峰高或峰面积；
- m—试样质量，g。

- 1.5.4.2 结果表示：计算结果保留三位有效数字。
- 1.6 技术参数
- 1.6.1 准确度：方法的回收率在92.7%~98.3%之间。
- 1.6.2 允许差：在重复性条件下获得的2次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的±10%。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】 净含量为56g/盒，允许负偏差为4.5%。

【原辅料质量要求】

1. 蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉

项 目	指 标
来源	蝙蝠蛾拟青霉 <i>Paecilomyces hepiali</i> Chen & Dai
配方：培养基	白砂糖(蔗糖)、黄豆饼粉、蛋白胨、葡萄糖、磷酸二氢钾、硫酸
制法	经菌种培养、发酵（26±2℃，发酵终点判断：发酵时间45～65h，还原糖≤1.0%）、过滤、干燥（90±5℃，30～35h）、包装等主要工艺制成。
感官要求	浅棕色至棕色粉末，具本品特有的滋味、气味，无异味
腺苷，mg/100g	≥245
水分，%	≤6.0
灰分，%	≤8.0

铅（以Pb计），mg/kg	≤0.5
总砷（以As计），mg/kg	≤0.3
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3
菌落总数，CFU/g	≤1000
大肠菌群，MPN/g	≤0.40
霉菌和酵母，CFU/g	≤50
沙门氏菌	≤0/25g
金黄色葡萄球菌	≤0/25g

2. 硬脂酸镁：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
